

## FULJETT TA' TAGHRIF

### Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija għall-użu personali tiegħek u m'għandekx tagħtiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollom l-istess sintomi bħall tiegħek.

### **F'dan il-fuljett:**

1. X'inhu Tasmarr u għalxiex jintuża
2. Qabel ma' tiehu Tasmarr
3. Kif għandek tiehu Tasmarr
4. X'effetti oħra jista' jkollu
5. Kif taħżen Tasmarr
6. Aktar tagħrif

Tasmarr 100 mg pillola miksija b'rita  
Tolcapone

- Is-sustanza attiva hija tolcapone (100 mg f'kull pillola miksija b'rita)
- L-ingredjenti l-oħra huma:  
Il-pillola minn ġewwa: Calcium hydrogen phosphate (anhydrous), Microcrystalline cellulose,  
Polyvidone K30, Sodium starch glycollate, Lactose monohydrate, Talc, Magnesium stearate..  
Kisi b'rita: Methylhydroxypropylcellulose, Talc, Yellow iron oxide (E 172), Ethylcellulose,  
Titanium dioxide (E 171), Triacetin, Sodium lauryl sulfate.

### **Sid l-Awtorizzazzjoni għall-Kummerç:**

Valeant Pharmaceuticals Ltd.  
Cedarwood, Chineham Business Park  
Crockford Lane  
Basingstoke  
Hampshire, RG24 8WD  
Ir-Renju Unit

### **Il-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lot huwa:**

ICN Polfa Rzeszów S.A.  
ul. Przemysłowa 2  
35-959 Rzeszów  
Il-Polonja

## **1. X'INHU TASMARR U GħALXIEX JINTUŻA**

Tasmarr 100 mg hija pillola miksija b'rita ovali li jtangi minn kulur ċar għal isfar ċar. Fuq naħa waħda hemm imnaqqxa "TASMARR" u "100". Tasmarr hija fornita bħala pilloli miksija

b'rita li fihom 100 mg tolcapone. Huwa disponibbli f'folji f'pakketti ta' 30 u 60 pillola u fi flixkien tal-ħgieg f'pakketti ta' 30, 60 u 100 pillola.

Tasmar jintuża flimkien ma' levodopa/benserazide jew levodopa/carbidopa meta l-ebda mediċina oħra ma tkun tista' tistabbilizza il-marda ta' Parkinson.

**It-terapija b'Tasmar għandha tinbeda biss minn tobbja b'esperjenza fil-kontroll tal-marda ta' Parkinson avanzata, sabiex tiġi assicurata evalwazzjoni xierqa tar-riskji u l-benefiċċji.**

Il-Catechol-O-methyltransferase (COMT) huwa enzim naturali f'gismek li jkisser il-medikazzjoni ta' levodopa użata sabiex tfejjaq il-marda ta' Parkinson. Tasmar jimblokka l-COMT u jrażżan it-tkissir tal-levodopa. Dan ifisser li meta tittiehed flimkien mal-levodopa (bħala levodopa/benserazide jew levodopa/carbidopa) għandu jkollok titjib fis-sintomi tal-marda ta' Parkinson

## 2. QABEL MA TIEHU TASMAR

**M'għandekx tibda tiehu Tasmar qabel ma t-tabib tiegħek ikun iddeskrivielek ir-riskji tat-trattament b'Tasmar u l-miżuri neċessarji sabiex timminimizza dawk ir-riskji, u jkun wiegħeb il-mistoqsijiet li inti jista' jkollok.**

**Għandek tingħata Tasmar biss jekk il-marda ta' Parkinson ma tkunx ikkontrollata b'mod adegwat b'terapiji oħrajn. Barra minn hekk, jekk wara 3 ġimghat ma titjiebx biżżejjed biex tiġġustifika r-riskji tat-trattament kontinwat, it-tabib iwaqqaflek it-trattament b'Tasmar.**

**Dannu fil-fwied:**

**Tasmar jista' jikkawża dannu fil-fwied rari iżda potenzjalment fatali. Id-dannu fil-fwied deher l-aktar wara xahar u wara 6 xhur. Dannu li jidher qabel jew wara huwa wkoll possibbli. Għandek tinnota li pazjenti femminili qeghdin f'riskju ikbar ta' dannu fil-fwied.**

***Qabel tibda t-trattament:*** Sabiex tnaqqas ir-riskju ta' dannu fil-fwied m'għandekx tuża Tasmar jekk: 1) għandek mard tal-fwied jew 2) testijiet tad-demmm magħmula qabel ma jinbeda t-trattament juru xi anormalità fil-fwied (testijiet ta' l-ALT *alanine amino transferase* u AST *aspartate amino transferase*).

***Waqt li tingħata t-trattament:*** Kull ġimagħtejn isiru testijiet tad-demmm għall-ewwel sena ta' terapija, kull 4 ġimghat għas-6 xhur ta' wara u kull 8 ġimghat wara dawk u jekk dawn isiru abnormali t-trattament jitwaqqaf. Is-sintomi segwenti jistgħu jindikaw dannu fil-fwied u għandek tirrappurthom lit-tabib tiegħek immedjatement: suffeġra (sfura fil-ġilda jew fl-ghajnejn), urina aktar skura, uġiġħ fl-istonku, (partikolarment fuq il-fwied fil-parti leminija ta' fuq), effetti aghar ta' nawżea jew ramettar, telf ta' l-aptit, jekk tgħeja iktar malajr mis-soltu jew thossok dghajjef.

**NMS (Sindromu Malinn Newroleptiku):**

**Is-NMS (Sindromu Malinn Newroleptiku) jikkonsisti fi xi uhud jew dawn kollha li ġejjin: ta' ebusija tal-muskoli severa, movimenti ta' ġbid fil-muskoli, id-dirghajn jew ir-riġlejn, u uġiġħ ta' muskoli. Id-dannu fil-muskoli kultant jista' jikkawża urina aktar**

skura. Sintomi importanti ohrajn huma d-deni gholi u l-konfużjoni mentali. Rari hafna, wara li Tasmar jew mediċini ohrajn kontra l-marda ta' Parkinson jitnaqqsu f'daqqa jew jitwaqqfu, tista' tesperjenza sintomi severi ta' ebusija tal-muskoli, deni jew konfużjoni mentali. Jekk dan isehh għarraf lit-tabib. Sintommi jistgħu jsehhu ukoll waqt t-trattament b'Tasmar.

**Qabel tibda t-trattament:** Sabiex tnaqqas ir-riskju tal-NMS m'għandekx tuża Tasmar jekk it-tabib tiegħek jgħidlek li għandek diskinesija (moviment involontarju) jew marda passata li setgħet kienet NMS. Għarraf lit-tabib tiegħek bil-medikazzjonijiet kollha, kemm dawk bir-riċetta u kemm dawk mingħajrha, għaliex ir-riskju tal-NMS jista' jiżdid jekk tkun qiegħed tiegħu medikazzjonijiet li jistgħu jibdlu l-effett tal-molekuli messagġiera tal-mohħ tad-dopamina u s-serotonin.

**Waqt li tingħata t-trattament:** Jekk tiżviluppa sintomi kif deskritt hawn fuq li taħseb li jistgħu jkunu NMS, għandek tirrappurthom immedjatament lit-tabib tiegħek. Twaqqafx Tasmar jew kwalunkwe medikazzjonijiet ohra għall-marda ta' Parkinson mingħajr ma tgħarraf lit-tabib tiegħek minhabba li dan jista' jżid ir-riskju ta' NMS.

#### **Tieħux Tasmar:**

- jekk għandek mard tal-fwied jew żjieda fl-enżimi tal-fwied.
- jekk għandek diskinesija severa (moviment involontarju).
- jekk għandek passat ta' Kumplex ta' Sindromu Malinn Newroleptiku (NMS) u/jew għandek *Rhabdomyolysis* mhux trawmatika jew ipertermja.
- jekk inti ipersensittiv (allergiku/a) għal tolcapone jew għal kwalunkwe mill-ingredjenti ta' Tasmar.
- Jekk għandek *Phaeochromocytoma*

#### **Oqghod attent hafna b'Tasmar:**

- jekk waqt it-trattament issofri minn kundizzjoni tal-fwied. It-trattament b'Tasmar xi kultant jista' jwassal għal disturbji fil-mod ta' kif jaħdem il-fwied. Għalhekk, jekk tesperjenza sintomi bħal nawzea, rimettar, uġiġħ addominali, telf ta' aptit, djufija, deni, urina skura jew suffejra, għandek tgħarraf minnufih lit-tabib tiegħek.
- jekk għandek xi mard barra l-marda ta' Parkinson.
- jekk inti allergiku/a għal mediċini, ikel u kulur ieħor.
- jekk qiegħed tiegħu mediċini ohrajn, inklużi dawk li tista' takkwista mingħajr riċetta.
- jekk diġà haadt Tasmar u żviluppajt dannu akut fil-fwied waqt li kont qiegħed tiegħu Tasmar, m'għandekx terġa' tibda teħodha.

#### **Meta tiegħu Tasmar ma' l-ikel u ma x-xorb:**

Ibla' Tasmar ma' l-ilma. Tasmar tista' tittiehed ma' l-ikel jew mingħajru.

#### **Tqala**

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk inti tqila jew jekk bi ħsiebek tkun tqila. It-tabib għandu jiddiskuti r-riskji u l-benefiċċji ta' Tasmar waqt it-tqala.

#### **Jekk qed tredra**

L-effetti ta' Tasmar ma' ġewx studjati fuq it-tfal. M'għandekx tredra' lit-tarbija tiegħek waqt it-trattament b'Tasmar.

#### **Sewqan u thaddim ta' magni:**

Tasmar għandha effett fuq is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Minhabba li l-hila tiegħek li ssuq jew tħaddem magni tista' tiġi affettwata mill-marda ta' Parkinson, għandek tiddiskuti dan mat-tabib tiegħek.

Tasmar meta jintuża flimkien mal-medikazzjoni tiegħek għal Parkinson jista' jkawża sonollenza (għejja eċċessiva) u episodji ta' rqaq b'hasda. Għalhekk għandek toqgħod lura minn sewqan jew tagħmel attivitajiet fejn nuqqas ta' attenzjoni jista' jqegħdek jew iqiegħed lil oħrajn fil-periklu ta' iŋurja jew mewt (eż. operazzjoni ta' makkinarju) sakemm tali episodji rikorrenti u sonollenza ma jkunu risolti

### **Tagħrif importanti dwar xi effetti mhux mixtieqa ta' Tasmar:**

Minnufih wara l-bidu u waqt it-trattament b'Tasmar, jista' jkollok sintomi kkawżati minn levodopa bħal diskinesija (moviment involontarju) u nawzea. Jekk ma tħossokx tajjeb, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minhabba li jista' jkollok bżonn bdil fid-doża ta' levodopa.

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza ċertu zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-medicina.

### **Konsum ta' medicini oħrajn:**

Jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek b'kull medicina oħra li qiegħed tieħu speċjalment antidipressanti, *alpha*-methyldopa (anti-ipertensiv), apomorphine (użata għall-marda ta' Parkinson), dobutamine (użata fil-kontroll tal-ħsara kongestiva fil-qalb), adrenalina (użata għall-attakki tal-qalb) u isoprenaline (użata għall-attakki tal-qalb).

Meta tkun qiegħed tieħu Tasmar ma' antikoagulanti (li jipprevenu t-tgħaqqid tad-demem) tat-tip ta' warfarin, it-tabib tiegħek jista' jwettaq testijiet tad-demem regolari sabiex isegwi l-facilità li biha jgħaqqad id-demem.

Jekk tmur l-isptar jew jekk tingħatalek medicina ġdida, għandek tgħarraf lit-tabib li qed tieħu Tasmar.

Jekk jogħġbok għarraf lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk qed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi medicini oħra, anki mhux bir-riċetta (medikazzjonijiet jew ħxejjex li ma jirrikjedux riċetta).

## **3. KIF JITTIEHED TASMAR**

Dejjem għandek tieħu Tasmar skond il-parir tat-tabib. Għandek tikkonsulta lit-tabib tiegħek jekk minitx ċert. M'għandekx tkisser jew tfarrak il-pillola.

### **Doża u Frekwenza ta' l-amministrazzjoni**

Meta tibda t-trattament b'Tasmar u waqtu, id-doża ta' levodopa jista' jkollha tinbidel. It-tabib tiegħek għandu jgħidlek x'għandek tagħmel.

It-tabib tiegħek għandu dejjem jibda t-trattament tiegħek b'doża standard (100 mg tliet darbiet kuljum). Jekk ma jidhrux benefiċċji fi żmien 3 ġimgħat mill-bidu tat-trattament, Tasmar għandha titwaqqaf. Id-doża għandha tiżdied biss għal dik oġhla (200 mg tliet darbiet kuljum) jekk iż-żjieda fil-mod ta' kif is-sintomi tal-marda ta' Parkinson jiġu kkontrollati tegħleb iż-żjieda mistennija fl-effetti sekondarji. L-effetti sekondarji bid-doża oġhla spiss jistgħu jkunu severi u jistgħu jaffettwawlek il-fwied. Jekk ma tmurx għall-aħjar bid-doża oġhla wara total ta' 3 ġimgħat, it-tabib tiegħek għandu jwaqqaf it-trattament tiegħek b'Tasmar.

**It-tabib tieghek ghandu jwettaq test tad-demm sabiex tiġi monitorata l-funzjoni tal-fwied qabel jinbeda t-trattament u mbagħad regolarment kull ġimagħtejn għall-ewwel sena, kull 4 ġimghat għas-6 xhur ta' wara u kull 8 ġimghat minn hemm 'il quddiem. Jekk it-tabib tieghek iżidlek id-doża, it-testijiet tal-fwied għandhom jiġu repetuti qabel iż-żjieda fid-doża u regolarment minn hemm 'il quddiem.**

L-ewwel doża ta' Tasmar tittiehed ma' l-ewwel doża tal-ġurnata ta' levodopa u d-doži l-oħrajn ta' Tasmar jittiehdu madwar 6 u 12-il siegħa aktar tard. Hu pillola waħda filgħodu, waħda f'nofs il-ġurnata u waħda filgħaxija.

Għandek tgħid lit-tabib tieghek jekk, għal xi raġuni, ma tiehux il-medicina eżatt kif preskritt. Inkella it-tabib jista' jaħseb li ma kinitx effettiva jew tollerata sewwa u jista' jibdel it-trattament tieghek bla bżonn.

**Jekk tiehu Tasmar aktar milli suppost għandek:**

Ikkuntattja tabib, spizjar jew sptar immedjatament minħabba li jista' jkollok bżonn attenzjoni medika urġenti.

Jekk persuna oħra aċċidentalment tiehu l-medicina tieghek, ikkuntattja tabib jew sptar immedjatament għaliex jista' jkollu/ha bżonn attenzjoni medika urġenti.

Sintomi ta' doża eċċessiva jistgħu jinkludu nawża, ramettar, sturdament u diffikultajiet fin-nifs.

**Jekk tinsa tiehu Tasmar:**

Hudha minnufih malli tiftakar, imbagħad kompli ħudha fil-hinijiet tas-soltu. Jekk qbiżt diversi doži, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tieghek u segwi l-parir li jtik. Tihux doża doppja biex tpatti għal doži individwali li nsejt tiehu.

**X'effetti jinhassu meta Tasmar jitwaqqaf:**

Tippruvax tnaqqas jew twaqqaf il-medicina sakemm ma jgħidlekx biex tagħmel hekk it-tabib tieghek.

Dejjem segwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tieghek dwar it-tul ta' żmien tat-trattament b'Tasmar.

#### **4. X'EFFETTI OĦRA JISTA' JKOLLU**

Bhall kull medicina oħra, Tasmar jista' jkollu effetti oħra.

Jekk ma tħossokx tajjeb waqt lit kun qed tiehu Tasmar għarraf lit-tabib jew spizjar tieghek kemm jista' jkun malajr.

L-effetti mhux mixtieqa li l-aktar jistgħu jidhru huma: diskinesija (moviment involontarju), nawża, problemi ta' l-irqad, tnaqqis fl-aptit, dijarrea, hażin, tħossok rasek ħafifa meta tkun bil-wieqafa, stitikezza u alluċinazzjonijiet.

***Ġew osservati disturbi fil-mod ta' kif jahdem il-fwied u xi kultant epatite severa. Għalhekk, jekk tesperjenza sintomi bħal nawża, rimettar, uġiġħ addominali, telf ta' aptit, djufija, deni, urina aktar skura jew suffejra, għandek tgħarraf lit-tabib tieghek immedjatament.***

Ftit wara li tibda u waqt it-trattament b'Tasmar, jista' jkollok sintomi kkawżati mil-levodopa bħal diskinesija (moviment involontarju) u nawża. Għalhekk, jekk ma tħossokx tajjeb,

għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minhabba li jista' jkollok bżonn li tibdel id-doża ta' levodopa.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tiżviluppa dijarrea persistenti jew severa.

Din il-mediċina tista' twassal għal bidla fil-kulur isfar ta' l-urina li ma tikkawża l-ebda dannu. Iżda jekk tinnota li l-urina tiegħek tiskura, dan jista' jkun sinjal ta' dannu tal-muskoli jew dannu tal-fwied, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek. Rari ħafna, meta jitwaqqfu jew jitnaqqsu f'daqqa t-trattamenti kontra l-marda ta' Parkinson, il-pazjenti jiżviluppaw Sindromu Malinn Newroleptiku (sintomi severi ta' ebusija tal-muskoli, deni jew konfuzjoni mentali).

Jekk tinduna b' xi effetti oħrajn li mhux imnizzlin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib jew spizjar tiegħek.

## 5. KIF TAĦŻEN TASMAR

Żomm fejn ma' jintlaħaqx u ma' jidhirx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali ma jinhtieg l-ebda kundizzjonijiet speċjali għall-ħażna

M'għandekx tuża wara id-data li jiskadi li tidher fuq il-pakkett.

M'għandekx tuża Tasmар jekk tara li l-pillolli huma ddanegġati.

## 6. GĦAL AKTAR TAGHRIF

Għall kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok għamel kuntatt mar-rappreżentant lokali tas-Sid ta' l-Awtorizzazzjoni għall-Kummerċ.

**België/Belgique/Belgien**  
(Zie/voir/siehe Nederland)

**Luxembourg/Luxemburg**  
(Voir/siehe Nederland)

**България**  
Bulgermed  
Тел.: + 359 2 9427070

**Magyarország**  
Valeant Pharma Magyarország Kft.  
Tel: +(36 1) 34 55 900

**Česká republika**  
Valeant Czech Pharma s.r.o.  
Tel: +420-2 214 34 111

**Malta**  
Vivian Cooperation  
Tel: +356-21344610

**Danmark**  
MediLink A/S  
Tlf: +45 70 22 30 15

**Nederland**  
Valeant Pharmaceuticals Benelux &  
Scandinavia B.V.  
Tel: +31 (0) 79 330 2424

**Deutschland**  
Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH  
Tel: +49 (0) 6196 99 88 90

**Norge**  
(Se Danmark)

**Eesti**

Berren Medical GmbH  
Tel: + 372 (0) 66 23 573

**Ελλάδα**

BIANEΞ A.E.  
Tel + 30 210 800 91 11

**España**

Valeant Pharmaceuticals Ibérica S.A.  
Tel: +34 93 362 43 60

**France**

Valeant Pharmaceuticals France, S.A.  
Tél: +33 1 39 496 550

**Ireland**

Allphar Services Ltd.  
Tel: +353 (0) 1404 1600

**Ísland**

(Sjá Danmark)

**Italia**

Valeant Pharmaceuticals Italy S.r.l.  
Tel: +39 (0) 2 678 7711

**Κύπρος**

Papaellina & Co Ltd  
Tel: + 357 22 741 741

**Latvija**

Berren Medical GmbH  
Tel: +371 721 16 29

**Lietuva**

Joint Stock Company Farmarkesa  
Tel: +370 5 261 31 42

**Österreich**

Valeant Pharmaceuticals Austria GmbH  
Tel: +43 (0) 463 590 832

**Polska**

ICN Polfa Rzeszów SA  
Tel: +48 (0) 22 627 28 88

**Portugal**

Codifar Crl.  
Tel: +351 218 391 000

**România**

(see United Kingdom)

**Slovenija**

(Pokličite Madžarsko)

**Slovenská republika**

Valeant Czech Pharma s.r.o. –OZ  
Tel: +421 (0) 264 284 801

**Suomi/Finland**

(Katso Danmark)

**Sverige**

(Se Danmark)

**United Kingdom**

Valeant Pharmaceuticals Ltd.  
Tel: +44 (0) 1256 707 744

**Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f' [data]**